

Lista de Vacunas para Adolescentes 11-19 Años de Edad

VACUNA	DOSIS	TIEMPO DE INMUNIZACIONES
Hepatitis B (Hep B) ¹	3 dosis	1ra. dosis 2da. dosis 1 mes después de la 1ra. dosis 3ra. dosis 4-6 meses después de la 2da. dosis
Sarampión, Paperas, Rubéola (MMR) ²	2 dosis	1ra. dosis 2da. dosis 1 mes después de la 1ra. dosis
Tétanos, Difteria (Td) ³	1 dosis	Dosis de refuerzo a los 11-12 años de edad Cada 10 años en lo sucesivo
Varicela ⁴	1 o 2 dosis	1ra. dosis 2da. dosis 1 mes después de la 1ra. dosis para personas mayores de 13 años
Hepatitis A (Hep A) ⁵	2 dosis	1ra. dosis 2da. dosis 6-12 meses después de la 1ra. dosis
Gripe ⁶	1 dosis	1 dosis anualmente para adolescentes en alto riesgo
Neumocócica Polisacárida (PPV) ⁷	1 dosis	1 dosis para adolescentes en alto riesgo
Meningocócica ⁸	1 dosis	1 dosis es recomendada para adolescentes de 11-12 años de edad, al momento de ingresar al high school (aproximadamente a los 15 años), y para estudiantes universitarios que viven en dormitorios de las universidades
Tos Ferina ⁹	1 dosis	1 dosis es recomendada en adolescentes 11-12 años de edad
Virus del Papiloma Humano (VPH) ¹⁰	3 dosis	1ra. dosis 2da. dosis 2 meses después de la 1ra. dosis 3ra. dosis 6 meses después de la 1ra. dosis

Vea en el lado al reverso para recomendaciones más detalladas

1. Hepatitis B: Tres dosis de la vacuna de hepatitis B son necesarias para una protección suficiente. Una vacuna de dos dosis de Hepatitis B están disponibles para adolescentes de 11 a 15 años de edad.

2. Sarampión, Paperas, Rubéola (MMR): Dos dosis de la vacuna MMR son recomendadas para una protección suficiente. Adolescentes que no han recibido previamente la segunda dosis de la vacuna de MMR deberán de completar el programa para la edad de 11 o 12 años. La vacuna MMR no se deberá de dar a adolescentes que se saben embarazadas o que están considerando un embarazo al mes siguiente a la vacunación.

3. Tétanos, Difteria (Td): La refuerzo Td es recomendada a los 11-12 años de edad y cada diez años sucesivamente.

4. Varicela: La vacuna de varicela es recomendada para cualquier persona que no ha padecido de la varicela o que no ha recibido la vacuna de varicela. Niños menores de 12 años de edad necesitan una dosis. Adolescentes mayores de 13 años de edad necesitan dos dosis. Una segunda dosis de la vacuna de varicela es recomendada para adolescentes que previamente recibieron una dosis. La vacuna de la varicela no se deberá de dar a adolescentes que se saben estar embarazadas o que están considerando un embarazo al mes siguiente a la vacunación.

5. Hepatitis A: Vive usted en una comunidad con muchos casos de hepatitis A? Viaja fuera de los Estados Unidos? Padece de un factor de desorden de coagulación o hepatitis crónica? Es un hombre que tiene sexo con otros hombres? Se aplica drogas? Si contestó **SI** a cualquiera de éstas preguntas, usted necesitará una vacuna de hepatitis A.

6. Gripe: Una vacuna anual contra el gripe es recomendada para cualquier persona con un serio problema de salud tales como asma, diabetes o padecimiento del corazón o cualquier persona que quiera evitar el gripe.

7. Neumocócica (Polisacárida): La vacuna PPV es recomendada para adolescentes con ciertas enfermedades serias tales como padecimiento del corazón, padecimiento de la enfermedad de células falciformes, enfermedad del pulmón, diabetes, leucemia, infección del VIH ó SIDA quienes están en gran riesgo de la enfermedad del neumocócica.

8. Meningocócica: La vacuna meningocócica es recomendada para adolescentes de 11-12 años de edad, que empiezan preparatoria (aproximadamente 15 años) o que van a entrar a la universidad y planean vivir en dormitorios de las universidades.

9. Tos ferina: La vacuna para la tos ferina (Tdap) es recomendada a los niños de 11-12 años y puede ser aplicada en lugar de la vacuna Td. La vacuna Tdap es también recomendada para adolescentes de 13-18 años que no recibieron un refuerzo a los 11-12 años y completaron previamente las series DTP/DTaP.

10. Virus del Papiloma Humano (VPH): La vacuna VPH es la primera vacuna desarrollada para prevenir el cáncer cervical, lesiones genitales precancerosas y verrugas genitales causadas por el VPH. La vacuna del VPH es recomendada para mujeres de 11-12 años de edad. Una vacuna de prevención es recomendada para mujeres de 13-26 años de edad que no han sido vacunadas anteriormente o quienes no han completado toda las series de vacunas.